LUNGEBETÆNDELSE HOS DEN IRSKE ULVEHUND

Vigtig information til ejeren

Lungebetændelse hos en irsk ulvehund er en alvorlig og hurtigt livstruende tilstand, som skal behandles akut.

Det har i årtier været anerkendt blandt ejere af irske ulvehunde (IWH), at de er modtagelige for luftvejsproblemer, især lungebetændelse. Lungebetændelse hos IWH præsenterer sig muligvis ikke med typiske symptomer som hoste, og i mange tilfælde er tilstanden dødelig, fordi den ikke genkendes i tide til at behandle den effektivt. Et andet problem, som IWH står over for, er, at den mest hensigtsmæssige behandling for tilstanden i øjeblikket stadig er uklar. En yderligere bekymring er, at IWH er en minoritetsrace, og derfor vil mange dyrlæger ikke have stødt på tilstanden, da de ikke ser IWH særlig ofte. Det er afgørende, at IWH-ejere og deres dyrlæger er opmærksomme på denne tilstand, især vigtigheden af hurtig behandling.

IWHG har udarbejdet dette informationsark ved hjælp af information, der er indsamlet fra kliniske detaljer og resultater af de sager, som vi har kendskab til, og er derudover baseret på IWHG's igangværende undersøgelse af bronkopneumoni. Vi håber, at vi ved at have udarbejdet disse noter kan hjælpe med at forbedre udfaldet for IWH med bronkopneumoni. Vi håber, at du vil finde detaljerne i dokumentet nyttige. Vi vil også sætte pris på din hjælp til at indsamle information til undersøgelsen af bronkopneumoni, som udføres af Angela Bodey BSc, BVSc, PhD, MRCVS og Mark Dunning MA VetMB PhD, CertSAM, DipECVIM-CA, MRCVS. Drs Bodey og Dunning arbejder sammen med IWHG om at indsamle casestudier og analysere dataene. Formålet er at identificere væsentlige faktorer, der påvirker udviklingen og udfaldet af denne tilstand, og om muligt den mest hensigtsmæssige behandling.

For yderligere information om projektet eller for at give kliniske detaljer om et tilfælde af bronkopneumoni, bedes du tjekke vores hjemmeside https://iwhealthgroup.com/health/a-z-of-health-information/pneumonia/ Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Miranda Brace via e-mail: mirandabraehead@gmail.com; din hjælp vil blive meget værdsat

Dette er den typiske holdning for en irsk ulvehund med lungebetændelse, med hoved og hals strakt fremad. Øjnene er fjerne og sløve, hun er tilbageholdende med at lægge sig ned, og hvis hun gør, er hun ude af stand til at ligge på siden. Fotografiet blev taget, så snart hunden blev syg. Hendes ejer, som kendte tegnene på lungebetændelse, sagde: "Da billedet blev taget, havde hun svært ved at trække vejret, kunne ikke ligge ned og havde en temperatur på 40,2 grader C"

Genkendelse af lunge-betændelse	• Pludselig opståen. • Vejrtrækningsbesvær. • Hovedet sænket og strakt fremad på niveau med ryggen, halsen strakt ud for at udvide luftvejene så meget som muligt. • Tilbageholdende med eller ude af stand til at ligge på siden. • Hoster muligvis, eller hoster muligvis ikke. • Temperaturen kan være meget høj - men en normal temperatur udelukker ikke nødvendigvis en diagnose af lungebetændelse. • Lungerne kan se rene ud på røntgen. • Der har været tilfælde af lungebetændelse hos ulvehunde efter en lungeorm-infektion. (Lungeorm er ikke længere begrænset til det sydlige England og findes i de fleste områder).
Behandling af lunge-betændelse	**AKUT!** • Hvis der er nogen tvivl, så behandl med antibiotika først og tag diskussionen bagefter! Indtag ikke en 'se tiden an'-holdning. • De fleste dyrlæger vil ønske at administrere en kombination af antibiotika intravenøst, da det er vigtigt at sætte hårdt og hurtigt ind. • En C-reaktivt protein (CRP) test ved starten af lungebetændelsesbehandlingen kan give et udgangspunkt for måling af inflammation. Gentagelse af den 2 uger efter påbegyndelse af en antibiotikakur kan hjælpe med behandlingsplanlægningen - vedvarende høje niveauer støtter fortsat behandling, mens normale niveauer er beroligende og kan tyde på, at inflammationen er aftaget. Dette kan derefter bruges sammen med din hunds kliniske billede til at beslutte, hvornår antibiotikaen skal stoppes. CRP-resultater bør altid fortolkes sammen med din hunds kliniske bedring og dyrlægens råd. • Intravenøs væske bør overvejes - men vær forsigtig, hvis din ulvehund har en hjertesygdom. • Medicinsk behandling skal fortsætte i 4-6 uger. • Anti-inflammatorisk medicin kan også være af værdi, især hvis temperaturen er høj. • Damp og coupage (rygklapning) kan hjælpe med at løsne slim fra lungerne. • Hvis din ulvehund har haft lungebetændelse, er det mere sandsynligt, at den får det igen.
Kritisk timing	• Hvis der ikke ses respons på behandlingen inden for 24 timer, opfordrer vi din dyrlæge til at tale med en specialist, da tid altid er en afgørende faktor ved denne tilstand. • Et langt behandlingsforløb på 4-6 uger tilrådes, da tilstanden ofte er tilbagevendende, og eventuelle tilbagefald kan reduceres, hvis der anvendes en antibiotikakur af passende varighed.
Gør dyrlægen opmærksom	• Tal med din dyrlæge - sørg for, at de er opmærksomme på, at irske ulvehunde er modtagelige for lungebetændelse og præsenterer sig med atypiske symptomer. Giv dem en kopi af retningslinjerne for dyrlæger ("Guidelines for Vets") og bed dem om at læse den og gemme den i din hunds journal.
Rådgivning	• Hvis du er bekymret for lungebetændelse og ønsker at tale med en erfaren ejer, bedes du kontakte mirandabraehead@gmail.com eller jean.timmins2016@gmail.com.
Survey	• Sundhedsgruppen indsamler alle casestudier, hvor hunde har haft lungebetændelse, for at opbygge argumentationen for kritisk og akut behandling samt genkendelse af de atypiske symptomer, denne race har. Du kan hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet på https://forms.gle/1TGsVT49xotjanCA7.
Video	• Se en video af en hund med lungebetændelse og se de tegn, du skal holde øje med: https://www.youtube.com/shorts/EDmk sMMGwl